

DEC 28 1950

LANE MEDICAL LIBRARY OF
STANFORD UNIVERSITY
300 PASTEUR ROAD
PALO ALTO, CALIFORNIA

LANE MEDICAL LIBRARY OF
STANFORD UNIVERSITY
360 PASTEUR ROAD
PALO ALTO, CALIFORNIA



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Ueber die Trigemimusneuralgie, in Sonderheit die Zahnschmerzen bei Felsenbeinspitzenempyemen.

Inaugural - Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde in der Zahnheilkunde
einer hohen medizinischen Fakultät
der Friedrich Alexanders-Universität zu Erlangen.

+

Vorgelegt von
Fritz Arnold
approb. Zahnarzt
aus Bamberg.

Tag der mündlichen Prüfung: 7. 9. 1936.

Referent: Priv. Doz. Dr. H. Richter.

Dekan: Geheimrat Prof. Dr. Jamin.

Meinen lieben Eltern.

Einleitung.

Die Trigemimusneuralgie (T. N.) gehört in das Grenzgebiet, in dem sich der Aufgabenkreis der Neurologie, der Chirurgie, der Zahnheilkunde und der Ohrenheilkunde schneidet.

Für uns Zahnärzte ist es überaus wichtig, die verschiedensten Ätiologien der T.N. zu kennen. Sie ist ja für uns ein sehr wichtiges Arbeitsgebiet, da viele Patienten, die mit dieser Krankheit behaftet sind, meist die Ursache ihres Leidens in die Zähne verlegen und somit die Kranken bei uns zuerst um Hilfe nachsuchen.

Es kommt immer wieder vor, daß der zur Verzweiflung ge-
riebene Kranke vom Zahnarzt flehentlich Hilfe erheischt und so oft ganze Kieferverstümmelungen durch nutzlose, sinnwidrige Zahnentfernungen durchgeführt werden.

Wenn man nun nach diesem Gesichtspunkt die otologische Literatur durchforscht, so findet man auch wiederholt, daß bei neuralgiformen Schmerzen, die ihre eigentlichen Ursachen in einer Ohrenerkrankung haben, dieselben von den Kranken in einen Zahn verlegt werden. So wurden in Fällen von Lange und Uffen-
borde die Zähne gezogen, ohne daß die Neuralgien dadurch gebessert wurden.

Umgekehrt suchen auch Patienten den Ohrenarzt mit Beschwerden auf, die den Verdacht auf eine bestehende oder sich entwickelnde Mittelohrentzündung hinlenken; darunter versteht man die „Otalgie ex carie dentium“, die von Zahnnerven ausstrahlend in der Tiefe des Gehörganges empfunden wird. Quälende Ohrenschmerzen werden auf diese Weise z. B. durch Erkrankungen der Kieferhöhle usw. bedingt und ursächlich auf das Ohr bezogen.

Eine rege Zusammenarbeit von Ohrenärzten und Zahnärzten zur schnellen Erkennung der Krankheitsbilder in diesem Grenzgebiet ist daher dringend nötig.

Die T. N., die gleichbedeutend mit „Gesichtsschmerz“ oder „Schmerzkrampf“ (Tic douloureux) ist, ist nicht mit dem „Muskelkrampf“ zu verwechseln. Dieser Muskelkrampf ist der zuckende Facialiskrampf mit den kurzen blißartigen Zusammen-

ziehungen der durch den motorischen Anteil des Facialis versor-
ten Gesichtsmuskeln. Hiervon unterscheidet sich nun wieder der
ununterbrochene „Kaumuskelkrampf“ (T r i s m u s).

Nach Schlander sind die in Frage stehenden Neuralgien
nicht zu verwechseln mit den heftigen, hämmernden, bohrenden
Schmerzen, wie sie im Beginn jeder akuten Otitis auftreten können
und in das Ohrinnere, aber auch in die Schläfen- und Scheitel-
gegend verlegt werden.

Im Rahmen dieser Arbeit besteht nun die Absicht, die Trig-
minusstörungen, die eine Folge von Pyramidenspitzenempyem
sind, näher zu behandeln.

Zu diesem Zwecke ist es nun notwendig, sich mit der Anatomie
der Pyramidenspitze und des Felsenbeins bekannt zu machen:

Anatomische Grundlagen.

Unter der Pyramidenspitze verstehen wir eigentlich den median-
sten und schmalsten Teil der Pyramide des Schläfenbeins, der je-
seits des Porus acusticus liegt.

Pragior gibt folgende Erklärung:

„Die F. S. ist zwischen Ala magna ossis sphenoidalis und der
Pars basilaris ossis occipitalis eingekeilt; sie bildet also einen
Teil der Schädelbasis, der, auf das ganze Schläfenbein bezogen,
nach innen und etwas nach vorne gerichtet ist. Die innere Fläche
der F. S. wird durch die Crista petrosa sup. in zwei Teile geteilt:
in einen vorderen (oberen), der einen Teil der mittleren Schädel-
grube darstellt, und in einen hinteren, der der vorderen Wand der
hinteren Schädelgrube angehört. An der oberen Fläche der F. S.
befindet sich eine flache Vertiefung für das Ganglion Gasseri, so-
wie eine Rinne, welche zusammen mit der Dura einen knöchernen
bindegewebigen Kanal (D o r e l l o) für den Nervus abducens bil-
det. Die Lokalisation des Kanals in bezug auf die F. S. sowie seine
Richtung sind nicht ganz einheitlich. Das Ganglion Gasseri liegt
einer sackförmigen Vorwölbung der Dura.

An der hinteren Fläche wird die F. S. vom Reste der Pyramide
durch den Porus acusticus internus abgegrenzt, in den sich die
Dura einstülpt.

Medial geht die F. S. unmittelbar in die Pyramide über. Medial
reicht sie bis an die Pars basilaris des Hinterhauptbeines und be-
deckt teilweise den Rand des Foramen lacerum. Die untere äußere
Fläche der F. S. vereinigt sich mit der Ala magna des Keilbeins
und mit dem medialen Teil des Os tympanicum. Der Canalis car-
oticus nimmt an der Teilung der F. S. in eine obere, innere und
untere — äußere Partie Anteil.“

Auch mit der Pneumatisation der F. S. wollen wir uns näher befassen, da sie ja Voraussetzung für die Bildung eines Empyems in der Spitze des Felsenbeins ist.

Nach den Untersuchungen von Mouret-Portmann-Wittmack-Uffenorde u. a. soll die Pneumatisation hauptsächlich auf zwei Wegen vor sich gehen.

Die eine Zellgruppe kommt vom Recessus epitympanicus, zieht sich über den oberen vertikalen Bogengang unter der Corcalis zunächst in die Gegend der Fossa subarcuata hin und setzt sich oberhalb des Porus gegen die eigentliche Pyramidenspitze zu ort.

Die zweite Hauptgruppe kommt von den peritubaren Zellen und zieht sich hypolabyrinthär um die Cochlea und Carotis gegen die Spitze hin. Sie bleibt mehr im unteren und breiteren Teil der Pyramide lokalisiert.

Manchmal nehmen sie auch einen dritten Weg der Spitzenpneumatisation an; dieser vollzieht sich mit Hilfe der perilabyrinthären Zellen im engeren Sinne. Sie sind meistens sehr klein und bevorzugen mehr den mittleren Teil der Pyramide.

Toback unterscheidet dagegen vier Zellzüge; er will die oben angeführte erste Zellgruppe nochmal geteilt wissen in einen oberen und hinteren Zellzug.

Der Referent dieser Arbeit, H. Richter, bestätigt diese Ansicht durch seine histologischen Untersuchungen, die in seiner soeben erschienenen Arbeit „Ueber Empyem der Felsenbeinspitze“ (Archiv f. O. N. K. Bd. 140 S. 360) enthalten sind.

Selbstverständlich sind die F. S. nicht alle in demselben Maße pneumatisiert. Man kann verschiedene Grade feststellen; hierbei kommen natürlich fließende Uebergänge vor.

Kraus stellt drei Formen von Pneumatisationsgraden auf, die sowohl für den Warzenfortsatz als auch für die Pyramidenspitze gelten: Die gute, mittlere Pneumatisation und als drittes die total gehemmte, kompakte Spitze.

Toback dagegen teilt die Pyramidenspitze nach ihrem Aufbau in vier Gruppen ein:

1. Spongiöse,
2. sklerotische,
3. teilweise pneumatisierte und
4. völlig pneumatisierte Felsenbeinspitzen.

Vor allem macht er darauf aufmerksam, daß er eine teilweise Pneumatisation nur in 3% gefunden hat und daß nur bei stark

pneumatisierten Warzenfortsätzen an eine Spitzenpneumatisation zu denken ist.

Glick hat bei 36 unter 42 von ihm untersuchten Präparaten jede Pneumatisation vermißt. Ferner stellt er fest, daß diese in einem mit dem Lebensalter ansteigendem Maße zeigt.

Zum Vordringen der Pneumatisation in das Spitzenmassiv muß eine besonders kräftige Pneumatisationstendenz vorhanden sein. Sie hängt vor allem von der Pneumatisation des Warzenfortsatzes ab, wenn auch eine gewisse Regelmäßigkeit im Aufbau beider Spitzen unabhängig vom Warzenfortsatz besteht. Je besser aber der Warzenfortsatz pneumatisiert ist, desto höher die Prozentzahl der Spitzenpneumatisation. Von den ideal pneumatisierten Warzenfortsätzen zeigen ungefähr die Hälfte gute Ausbildung der Spitzenzellen. Dagegen ist bei mehr oder weniger gehemmter Pneumatisation des W. f. s. eine Pneumatisation der Spitze nicht möglich.

Nach T o b e c k stellt daher die Pneumatisation der Spitze in jedem Falle, wo sie vorhanden ist, etwas von der Norm abweichen dar.

Manche Autoren (Balan und Belinoff, Pragier) weisen darauf hin, daß man manchmal eine einzige große Zelle in der Spitze findet, die mit dem perilabyrinthären Zellkomplex kommuniziert.

Pathologische Anatomie.

Die Eiterung in der Pyramidenspitze hat wohl fast immer ihren Ausgang von einer Otitis media acuta.

Daß das Auftreten von Komplikationen im Anschluß an akute Mittelohrentzündungen weniger an ein für den Kranken ungünstiges Virulenzverhältnis zwischen Bakterien und Körper gebunden ist, sondern vorwiegend auf anatomische Verhältnisse zurückzuführen ist, bemerkt Hesse wie folgt: „Wir haben es bei den akuten Mittelohrentzündungen meist mit sehr wenig virulenten Bakterien zu tun, die bereits durch die normalerweise vorhandene Bakterizidie des Blutes stark in ihrer Entwicklungsfähigkeit behindert werden. Nach längerer Krankheitszeit und bei weiterer Ausdehnung der Infektion ist zumeist auch eine spezifisch erhöhte Abwehrkraft des Blutes nachzuweisen.“

Das Haften der Infektion und das Auftreten von Komplikationen ist in anatomischen Verhältnissen begründet; es beruht erstens häufig auf einer persistenten, hyperplastischen Schleimhaut in den Mittelohrräumen und dem Zellsystem und zweitens auf einer Verlegung des Sekretabflusses aus dem entzündeten Zellgebiet.

Unter Berücksichtigung der anatomischen Verhältnisse und der Pneumatisation der Pyramidenspitze ist es eigentlich selbstverständlich, daß eine Eiterung aus dem Mittelohr gegen die Felsenbeinspitze fortkriechen kann.

Für das Vordringen einer Entzündung vom Mittelohr zur Felsenbeinspitze gibt es mehrere Infektionswege. In erster Linie kommen natürlicherweise präformierte Wege in Betracht, Bahnen, auf denen der vordringende Prozeß die geringste Behinderung erfährt.

Brunner nimmt auf Grund eigener Untersuchungen an, daß in der Regel mehrere Wege beschriftet werden, zu denen gewöhnlich der Canalis caroticus, der Hiatus subarcuatus, die vom Antrum ausgehenden perilabyrinthären Zellen und die peritubaren Zellen gerechnet werden.

Grünberg nimmt als Ueberleitungsweg der Entzündung die pneumatischen Räume von der Umgebung des Antrum zu der Spitze hin an.

Dies wird auch durch die histologischen Untersuchungen von I. Richter bestätigt. In seiner schon oben angeführten Veröffentlichung stellte auch er den Zusammenhang zwischen der Paukeneiterung und den Empyemen innerhalb der Felsenbeinspitze fest.

Nicht nur in der neueren, sondern schon in der älteren Literatur findet man über diese Tatsache Bemerkungen.

Als einer der ersten erwähnt v. Tröltsch die Propagationsmöglichkeit der Entzündung über die prälabyrinthär gelegenen pneumatischen Räume der Pyramide, die gelegentlich die ganze Pyramide durchsetzen können.

v. Urbantschitsch konnte an Knochenpräparaten den Zusammenhang dieser Räume mit dem Mittelohr nachweisen, zeigte aber auch, daß diese in der Pyramide gelegenen Lücken nach der Oberfläche des Felsenbeins offen sein können. Die Verbindungswege in das Innere der Schädelhöhle finden wir bei ihm folgendermaßen dargestellt:

„In der Nähe des Ostium tympanicum tubae, zuweilen in dessen oberer Hälfte oder etwas weiter nach rückwärts an der inneren Paukenwand, befindet sich manchmal eine kleine Knochenlücke, die an einem von mir untersuchten Präparat sogar einen Durchmesser von 2,5 mm aufwies. Durch diese Oeffnung gelangt man in die um das Cavum tympani und Labyrinth befindlichen pneumatischen Räume, welche sich nach vorne bis zur Spitze der Pyramide erstrecken. In den erwähnten Fällen konnte eine in die Knochenlücke eingeführte Borste bis zur Pyramidenspitze vorgeschoben

werden und schimmerte durch die papierdünnen Knochenwände derselben deutlich durch. An einzelnen Präparaten bemerkte ich in dieser dünnen Knochendecke an der Spitze der Pyramide kleine Lucken, durch welche die pneumatischen Räume der Pyramide mit der Schädelhöhle in Verbindung standen. Demzufolge gelangte auch in diesen Fällen eine in die erwähnte Lücke des Cavum tympani eingespritzte Flüssigkeit bis in die Schädelhöhle und es war daher leicht denkbar, daß auch der im Cavum tympani angesammelte Eiter in einem entsprechenden Falle denselben Weg einschlagen könnte.“

Aber auch ohne die von Urban t s c h i s c h erwähnten seltenen Lucken setzt die dünne Knochenwand einem Durchbruch des Eiters nicht viel Widerstand entgegen.

„Die Zelleiterung kann die Corticalis der Pyramide durch die fruhrende, rarefizierende Otitis in kleinerem und größerem Ausmaß oder gar an verschiedenen Stellen zerstören, sodaß tiefer gelegene epidurale Abszesse im Bereich der mittleren oder hinteren Schädelgrube oder Abszesse an der Schädelbasis entstehen können. Von diesen Abszessen aus können die Eitererregstoffe durch die Dura hindurchwandern und die Meningitis auslösen.“ (T o b e c k.)

Die Dura mater ist erfahrungsgemäß den Entzündungsprozessen gegenüber weit widerstandsfähiger als der Knochen. Nach Abbau des Knochens wird die Eiteransammlung unter der real verdickten Dura ganz beträchtlich. Die Dura wird vom Knochen abgedrängt und in die Höhe getrieben, bis sie an einer oder mehreren Stellen durchbrochen wird.

Derartige Duradurchbrüche finden nicht nur an den freien Oberflächen der Pyramide statt, sondern gar nicht so selten auch im Bereich des inneren Gehörgangs (Brock) und im Bereich der Impressio trigemini, sodaß eine eitrige Infiltration des Ganglion Gasseri und eine davon ausgehende Meningitis die Folge ist.

Den histologischen Nachweis über die eitrige Infiltration des N. trigeminus erbrachten mehrere Autoren, so z. B. Ulrich, Schlander und Uffenorde. Bei letzterem finden wir folgenden histologischen Befund.

„Ganglion Gasseri stark eitrig infiltriert, die einzelnen Nervenbündel durch Eiterstreifen auseinandergedrängt. Innerhalb der Nerven zahlreiche Corpora arenacea in verschiedener Größe der typisch konzentrischen Schichtung.“

Dasselbe gilt natürlich auch für den Nervus VI, der sich ja in unmittelbarer Nähe des G. trigemini befindet.

Über die Klinik.

Die eitrige Infiltration der Nerven ruft selbstverständlich Ausfallerscheinungen hervor.

Auf den Zusammenhang einer Mittelohrerkrankung mit Lähmung des Nervus VI und intensiven Schmerzen, die durch die angewandten üblichen Mittel nicht zu beseitigen waren, hat Gradenigo zuerst aufmerksam gemacht. Er hob hervor, daß dieses Krankheitsbild einen besonderen Symptomenkomplex darstelle. Über diesen sogenannten Gradenigoschen Symptomenkomplex wurde seither sehr viel diskutiert.

In seiner zweiten Bearbeitung faßt Gradenigo in den Schlußfolgerungen dieses Krankheitsbild folgendermaßen zusammen: „Es existiert ein typisches Krankheitsbild, das im wesentlichen durch eitrige akute Mittelohrentzündung, intensive Schmerzen, namentlich in der Schläfen-Scheitelbeingegend der erkrankten Seite und durch Paralyse des Nervus abducens derselben Seite charakterisiert ist...“

In einem kritischen Sammelreferat von Vogel kommt zum Ausdruck, wie verschieden die Auffassungen über diesen Symptomenkomplex sind. Er hat darauf hingewiesen, daß ein großer Teil der unter dem „Gradenigoschen Symptomenkomplex“ in der Literatur aufgeführten Fälle gar nicht zu diesem Krankheitsbild zu rechnen sind, weil sie sich nicht mit dem von Gradenigo aufgestellten Symptomenkomplex decken.

Im Laufe der Zeit trat allerdings in der Bedeutung der einzelnen Symptome ein Wandel ein. Dies mag hauptsächlich darauf beruhen, daß die Abducenslähmung sehr auffallend war und durch Untersuchung festgestellt werden konnte, während bezüglich der Trigeminostörungen zu berücksichtigen ist, daß sie leicht in dem Gesamtsymptomenbild untergehen können, und daß nur bei besonderem Daraufbedachtnehmen die Erhebungen in dieser Hinsicht verläßlich sind. Die Schmerzen an den Zähnen des Ober- und Unterkiefers gehen meist in dem übrigen Krankheitsbild und den örtlichen Schmerzen unter und können erst auf besonderes Befragen hin dem Kranken bewußt werden.

Grabscheid stellte dazu fest, daß mit der Zunahme der Kenntnisse in Bezug auf die Symptomatologie dieser Erkrankungen auch die Zahl dieser Fälle zunahm. Zunächst stellte sich heraus, daß sich die Symptome von seiten des Abducens, die man für die Diagnose ganz besonders charakteristisch immer wieder hervorhob, weit seltener fanden, als die Symptome von seiten des Trigeminus.

Als erster hat v. Tröltsch noch vor Gradenigo auf das Auftreten von Trigemimusneuralgien im Verlaufe einer Mittelohreiterung hingewiesen. Auch Schmiegelow erwähnt in einer Mitteilung das Auftreten von Trigemimusneuralgie in allen Zweigen bei einer alten Mittelohreiterung.

Aber erst Uffenorde verdanken wir eine eingehende Förderung der Bedeutung dieses Symptoms: „Die Trigemimusneuralgien können die verschiedensten Heftigkeitsgrade aufweisen, auch wenn die entzündlichen Herde im Felsenbein auf die mehr sensiblen Teile beschränkt bleiben und scheinbar durch Fernwirkung und Ausstrahlung die Schmerzen auslösen. Sind allmählich alle Trigemimusäste beteiligt und kommt es zu sehr heftigen und sich häufenden Anfällen, so mag man mit Vorbehalt auf eine mehr oder weniger unmittelbare Reizung des Ganglion Gasseri schließen dürfen.“

Loebell, der eine weitere Detaillierung der Trig. Symptome in Bezug auf die Erkrankung einzelner Trig. Äste versucht, erklärte die heftigen Kopfschmerzen wie folgt:

„Von großer Wichtigkeit für die Erklärung der heftigen Kopfschmerzen sind die drei *Nervi recurrentes* des Trigemini. Der *N. tentorii* (V, 1) verzweigt sich bekanntlich im Tentorium bis zum Sinus transversus, er versorgt also im wesentlichen die Dura der hinteren Schädelgrube.

Der *N. meningaeus medius* (V, 2) sendet feine Äste zur Dura am vorderen Ast der *A. meningea media*, er bleibt im Gebiete der mittleren Schädelgrube, wie auch der *N. spinosus* (V, 3), der durch das nach ihm benannte Foramen in die Schädelhöhle zurückgekehrt und mit der *A. meningea media* zur Dura verläuft.

Zwanglos finden so die starken über den ganzen Kopf ausstrahlenden neuralgischen Beschwerden ihre Erklärung. Denn ist einmal ein Ast des Trigemini betroffen, so können die sensiblen Reizerscheinungen ins Ganglion und von dort in gleicher Weise zu allen drei *Nervi recurrentes* gelangen und heftigste Kopfschmerzen verursachen.

Ferner ist Loebell der Meinung, daß ein Befallensein eines Trigemimusastes allein für den *Mandibularis* möglich ist. Er liegt von den drei Trig. Ästen der Felsenbeinkante am nächsten und ist durch sein *Perineurium* sofort beim Abgang aus dem Ganglion von den beiden anderen Ästen bis zu einem gewissen Grade abgeschlossen. Für letztere ist jedoch eine isolierte Affektion kaum anzunehmen.

Einige Autoren wie Oppikofer, Habermann, Lang und Grünberg haben bei ihren mikroskopisch untersuchten Fällen das Ganglion Gasseri unverändert gefunden, obwohl gerade

Bei den letzteren Beobachtungen der Schmerz hauptsächlich ins Gesicht und die Zahnreihen ausstrahlte. Hier wird wohl der Druck die wesentlichste Rolle gespielt haben.

Hilgermann weist u. a. neben den Neuralgien auch auf die Nästesien im Trig. Gebiet hin, die den Verdacht auf Eiterherde in der Felsenbeinspitze bei bestehenden Mittelohreiterungen hinlenken könnten. Auch Uffenorde hat einen einschlägigen Fall beschrieben. Diese scheinen aber sehr selten zu sein.

Es finden sich in der Literatur verschiedene Fälle (so von Lange, Brock, Grünberg, Oppikofer und Uffenorde), bei denen selbst bei schwerster Veränderung im Gebiet der Felsenbeinspitze jede Störung von seiten sowohl des Trigemini als auch des Abducens vermißt werden. In diesen Fällen ist wohl eine überaus schwere eitrige Infiltration des Ganglion trigemini sofort eine weitgehende Ausschaltung des Organs mit sich gebracht. So ist auch Brunner der Ansicht, daß ein Fehlen dieser Neuralgien nicht eine Veränderung der Felsenbeinspitze ausschließt.

Daß dem Abducens allein nicht mehr die überragende Bedeutung für ein Pyramidenempyem zukommt, ist allgemein gültig. Abducenslähmung kann auch das Symptom einer otogenen oder eitrigen Meningitis, eines Hirnabzesses oder einer Sinusthrombose sein. Nur in Verbindung mit anderen Symptomen, insbesondere einer Trigeminusneuralgie, ist die Abducensparese typisch für die Erkennung einer Erkrankung der Spitze des Felsenbeins.

Der Abducens wird bisweilen schon bei einfachen Mittelohrentzündungen, die von selbst heilen, offenbar durch toxische Einwirkungen gelähmt. Die Empfindlichkeit und sein langer Verlauf an der Basis der hinteren und mittleren Schädelgrube, wo er mit der Spitze der Felsenbeinpyramide in Berührung kommt, sind wohl Ursache dafür, daß wir Abducenslähmungen bei den verschiedensten otogenen Entzündungen der Schädelgruben häufig beobachten.

Für die Diagnose eines Felsenbeinspitzenempyems ist das Röntgenbild ungeheuer wichtig. Es sollte daher dessen Anfertigung bei Trigeminusneuralgien im Verlauf einer Otitis nicht unterbleiben.

Für die Betrachtung der Pyramidenspitze kommt in erster Linie die Aufnahme von Stenvers in Frage, da auf ihr die Spitze frei von störenden Ueberlagerungen erscheint.

Die ersten röntgenologisch feststellbaren Veränderungen der pneumatisierten Felsenbeinpyramiden sind verminderter Luftgehalt infolge Dickenzunahme der Weichteilaukleidung, dann Rückgang des Kalkgehaltes der Zwischenwände bis zum Zustand des Schwundes von Knochensubstanz und des endlichen Auftretens von Resorptionsherden.

Außer den anderen otogenen endokraniellen Komplikationen wie Meningitis, Hirnabzeß, Sinusthrombose, in deren Verlauf Abducenslähmungen und Trigeminusneuralgien ähnlicher Art auftreten können, sind differentialdiagnostisch die organischen Erkrankungen, die das Felsenbein berühren, wie Trauma, Tumore, Syphilome an der Schädelbasis zu berücksichtigen.

Außer zu extraduralen Abszessen führt das Wachstum des Spätempyems noch zu Einbrüchen ins Labyrinth und in die Weichteile. (Richter.)

Obwohl das Labyrinth gegen Eiterungen der perilabyrinthären Zellen durch eine verhältnismäßig starke kompakte Knochenschicht gut geschützt zu sein scheint, kann ein solches Empyem doch in die Bogengänge einbrechen. Dies ist nicht nur durch klinische Untersuchung, sondern in einigen Fällen auch durch den mikroskopischen Befund (Uffenorde, Lange, Richter) sichergestellt worden.

Diese Labyrintheiterungen sind aber nicht so häufig wie die Weichteilabszesse. Bedenklich sind hier die Einbrüche in den karotischen Kanal und in das Foramen jugulare.

Von den Empyemen, die von Eiterungen in den peritubären Zellen herzurühren scheinen, gibt es auch einen besonderen Typus, bei dem es hinter dem Gaumen zu einem Senkungsabszess in den Rachen kommt. Bei Druck auf diesen erfolgt dann Eiterausfluß aus dem betreffenden Ohr. Manchmal entleert sich der Eiter auch spontan, wenn der Abzeß nicht vorher incidiert wurde, und es tritt Heilung ein.

Entleert sich nun ein Empyem der Felsenbeinspitze auf irgendeinem Weg in die hintere Schädelgrube, so besteht die Möglichkeit, daß der Eiter von hier aus durch die Foramina mastoidea auf die äußeren Bedeckungen des Schädels übergreifen kann (Körner.) Diese Nackenabszesse führen auch zur Entlastung des gestauten Eiters, sodaß ebenfalls nach Incision oder Spontanentleerung Heilung eintritt.

Es ist erstaunlich, daß ziemlich viele Patienten mit den Gradenigoschen Symptomen heilen. Kommen andere Erscheinungen hinzu, die auf eine eitrige Meningitis, Sinusthrombose u. a. schließen lassen, so muß natürlich erst recht gründlichst operiert werden. Doch wo es den Schein hat, daß das Syndrom von einer isolierten Affektion der Felsenbeinspitze hergeleitet werden kann, so ist die Prognose nicht so ungünstig, da ja — ganz allgemein gesprochen — nicht jedes Empyem zum Durchbruch ins Gehirn führen muß. Die Empyeme zeigen eine ziemlich große Neigung zur Spontanheilung; nach Scheibe tritt sie bei 37% der Ohrenempyeme ein. Die Heilung kann bei genügend breiter Freilegung des Antrum

der Mittelohrs und opitalem Ausräumen der Zellen am ehesten wartet werden.

Zu diesen Fragen äußert sich Oppikofer wie folgt:

„Auch in den Fällen von Warzenfortsageröffnung mit fast negativem Operationsbefund bringt aber doch die Warzenfortsageröffnung bei unsicheren Fällen den Vorteil, daß der Arzt durch das Weiterbestehen der Anfälle von heftigen und einseitigen Trigeminiusschmerzen nach der Operation auf die Möglichkeit einer fliegenden Komplikation der akuten Otitis hingewiesen und zur Vorsicht bezüglich der Prognosestellung ermahnt wird und zwar auch dann, wenn mittlererweile Gehör und Trommelfell wieder normal geworden sind. Die Frage, ob man bei Bestehen und Anauern der Trigeminiusschmerzen nach Antromomie und Einsetzen richtiger Temperatursteigerungen den schwierigen und lebensgefährlichen Eingriff des Freilegens der Felsenbeinspiße wagen soll, wird nur von Fall zu Fall nach vorsichtigem Abwägen entschieden werden können. Sicher ist, daß man für gewöhnlich besser an wird, diesen radikalen Eingriff zu unterlassen und abzuwarten oder nur bis auf Höhe des inneren Gehörgangs, wohl dann am ehesten translabyrinthär, vorzugehen, letzteres Verfahren in der Hoffnung, daß die rückbildungsfähige Entzündung in der Pyramiden Spitze durch eine auf Höhe des inneren Gehörgangs liegende Empyemzelle verursacht werde.“

Die Indikationsstellung zu solch großen und gefährlichen Eingriffen muß natürlich eng begrenzt sein. Dazu sagt Ulrich: „Trennen nach einer Mittelohroperation Abducenslähmung und Trigeminiusschmerzen mehrerer Aeste mit Temperatursteigerung auf und steigern sich letztere bei neuen, auch nur geringen Fieberschüben, so ist der Moment zum Eingreifen gekommen.“

Beobachtungen der Erlanger Klinik.

In der Erlanger Klinik wurden in den Jahren 1925 bis 1935 einschließlich 17 Fälle von Felsenbeinspißenempyemen beobachtet. Zur besseren Uebersicht haben wir dieselben in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Bei allen unseren Fällen handelt es sich selbstverständlich um akute Otitiden, die auch sämtlich operiert wurden. Gelegentlich wurden auch eine oder mehrere Nachoperationen vorgenommen.

Osteomyelitis der Felsenbeinspiße, die nach einer neueren Arbeit Tobacks dieselben Symptome wie die Spizenempyeme hervorrufen kann, ist in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, da sie nicht beobachtet wurde.

Name	Alter	S.	Bakter.- Unters.	Nervus V	Nerv. VI	Kompli- kationen	K. D. H. o. E.	Ausgang
1925 1. Johann Z.	57	r.	Pneumok. Typus III	Starke stechende Schmerzen im I. Ast li. vom Ende des I. Krankh.-W. b. z. Tod	—	Meningitis Diabetes!	3 W.	gest. histol. unters.
1926 2. Jakob R.	57	l.	Pneumok. Typus III	—	—	Meningitis	3 M.	gest. histol. unters.
3. Wilh. Z.	29	l.	Pneumok. Typus III	Ab 3. Krank.-W. starke Schlä- fenschmerzen li., ab 5. Krank- heits-W. immer stärker b. z. T.	Parese li.	Meningitis	2 M.	gest. histol. unters.
1928 4. Andreas H.	58	l.	Hämoly- sierende Strept.	Stech. Schmerzen d. I. Astes, ins Auge ausstr., v. d. 4. Kr.- Woche bis zum Tod	Parese li.	Meningitis	2 M.	gest. histol. unters.
1929 5. Friedr. D.	38	r.	Pneumok. Typus III	Starke Schmerzen in allen Aesten	Parese r.	Meningitis	2 M.	gest. histol. unters.
1930 6. Marga. B.	42	r.	Pneumok. Typus III	Im li. Auge u. li. Kiefer starke lanzinierende Schmerzen	—	Retro- pharyngeal- Abszess	6 M.	geheilt
7. Anna B.	10	l.	Pneumok. Typus III	Starke Hyperästhes. d. I. Astes li. v. d. 2. Krankh.-Woche bis zum Tod	Parese l.	Meningitis	5 W.	gest. nicht seziiert
8. Konrad G.	32	r.	Hämoly- sierende Strept.	Starke Schmerzen im I. Ast li. v. d. 3. Woche bis zum Tod	—	Meningitis	2 M.	gest. histol. unters.
9. Georg R.	16	r.	Hämoly- sierende	Nervenaustrittsstelle d. I. Ast. r. druckempfindlich	Parese r.	Meningitis	5 W.	gest. histol.

Name	Alter	S.	Unters.	Nervus V	Nerv. VI	kationen	H.o.E	Ausgang
1932 10. Albert F.	36	I.	Hämoly- sierende Strept.	Starke ausstrahlende Schmer- zen im li. Auge u. li. Oberkiefer	Parese li.	—	3 M.	geheilt
1933 11. Georg D.	45	I.	Pneumok. Typus III	—	—	Retroph.- Abszess Nackenabz.	8 M.	geheilt
1934 12. Olga E.	45	I.	Pneumok. Typus III	Heflige lanzinierende Schmer- zen in der ganzen li. Gesichtshäl- fte, auch Zähne u. Nacken	Parese li.	Retro- pharyngeal- Abszess Nackenabz	ca. 1 J.	geheilt
13. Helm. St.	10 1/2	I.	Hämoly- sierende Strept.	Starke Schmerzen i. li. Auge u. li. Unterkiefer. Cornealreflex li. etwas lebhafter	Parese li.	Retro- pharyngeal- Abszess	3 M.	geheilt
1935 14. Georg A.	66	r.	Pneumok. Typus III	Zeitweise auftretende heftige Stirn-Schlafen-Kopfschmerzen in der ganzen Kr.-Dauer	—	Meningitis	3 W.	gest. histol. unters.
15. Erich B	7	I.	Pneumok. Typus I	—	Parese li.	Extradural- Abszess d. m. Schädelg.	6 W.	geheilt
16. Helene H.	36	r.	Pneumok. Typus III	Sensibil. d. ganz. Gesichtshaut gest., ziehende Schmerzen i. d. Zähnen li. oben und li. unten	Parese r.	Meningitis	8 W.	gest. histol. unters.
17. Willi P.	5	r.	Staphyl. albus Mildstr. Strept.	Starke ziehende Schmerzen i. I. Ast li. v. d. 2. Krankh.-W. b. z. Operation i. d. 4. Krankh.-W.	Parese r.	—	9 W.	geheilt

Rückblick.

Gehen wir nun zur Besprechung der Einzelheiten unserer Feststellungen über, so können wir in Bezug auf das Geschlecht bemerken, daß es sich 13mal um männliche und 4mal um weibliche Individuen gehandelt hat.

O. Voß stellte bei seinen 12 beobachteten Fällen von Pyämidenepigoneiterungen ungefähr dasselbe fest: nämlich 9 männliche und 3 weibliche Patienten. Sonst ist im Schrifttum von einer Ueberwiegen des männlichen Geschlechts nicht die Rede.

Der Zeitpunkt der Erkrankung unserer beobachteten Fälle war ungefähr gleichmäßig auf das ganze Lebensalter verteilt. So standen im

1. Jahrzehnt	2
2. „	3
3. „	1
4. „	4
5. „	3
6. „	3
7. „	1
zusammen	17

Der jüngste Patient war 5 Jahre, der älteste 66 Jahre alt.

Eine Bevorzugung einer Seite konnten wir nicht feststellen. Die rechte Seite war 8mal, die linke 9mal erkrankt.

Die bakteriologischen Untersuchungen wurden ausnahmslos von der Staatl. Bakteriologischen Untersuchungsanstalt in Erlangen durchgeführt. Diese Untersuchungen haben in 12 Fällen, dies ist also über die Hälfte aller Fälle, den *Pneumococcus mucosus* ergeben. In weiteren 5 Fällen wurden hämolysierende *Streptococcen* festgestellt. Auf diesen beiden Erregern kamen in je einem Fall noch zwei weitere Erreger vor. Im Fall 15 war *Pneumococcus Typus I* und im Fall 17 *Staphylococcus albus* in Verbindung mit *Milchsäure-Streptococcen* das Ergebnis der Untersuchung. Die *Mucosus*-Eiterungen überwiegen also ganz beträchtlich.

Bei nicht weniger als 14 Fällen waren mehr oder weniger heftige Trigemimusneuralgien vorhanden. Das sind also mehr wie $\frac{4}{5}$. Ein ähnliches Resultat, nämlich 83% stellte auch O. Voß fest. Diese Trigemimusschmerzen bestanden zum größten Teil in Kopfschmerzen stechenden und ziehenden Charakters wechselnder Stärke und verschiedenster Lokalisation. Die Stirn-

schlafen-, Scheitel- und Augengegend wurden hauptsächlich von den Kranken als schmerzende Stellen angegeben. 5 Patienten verglichen den Sitz ihrer Schmerzen in den Oberkiefer oder Unterkiefer und in die Zähne. Bei einem Kranken (Fall 5 — Friedr. D.) waren die rechtsseitigen Kiefer- und Kopfschmerzen so stark, daß er wiederholt Selbstmordäußerungen getan hat.

Der Nervus abducens war weniger häufig betroffen als der Trigeminus. Eine Parese wurde bei 11 von 17 Fällen wahrgenommen, also bei $\frac{2}{3}$ aller Kranken. Vogt fand das gleiche Verhältnis.

Ohne jede Komplikation im Krankheitsverlauf blieben zwei der geheilten Patienten.

10mal bestand eine Meningitis; diese Kranken sind alle verstorben. Einer von diesen (Fall 1 — Joh. Z.) litt auch noch an Diabetes.

Ein Retropharyngeal-Abzeß wurde 4mal beobachtet, bei 2 dieser Kranken war gleichzeitig auch ein Nackenabzeß vorhanden. Diese 4 Patienten konnten geheilt werden.

Bei einem ebenfalls geheilten Patienten entwickelte sich ein extraduraler Abzeß der mittleren Schädelgrube.

Die Krankheitsdauer vom Beginn bis zur Heilung oder Exitus war sehr unterschiedlich. Sie betrug:

2mal 3 Wochen
2mal 5 Wochen
1mal 6 Wochen
6mal 2 Monate
3mal 3 Monate
1mal 6 Monate
1mal 8 Monate
1mal ca. 1 Jahr

zusammen 17.

Es ist bemerkenswert, daß alle verstorbenen Patienten keine längere Krankheitsdauer als 2 Monate hatten.

7 Patienten konnten der Heilung zugeführt werden. Von den 10 verstorbenen Kranken konnte bei 9 eine Obduktion ermöglicht werden.

Ich möchte noch darauf hinweisen, daß die histologischen Untersuchungen der Felsenbeine von dem Referenten dieser Arbeit vorgenommen wurden. Die meisten Ergebnisse veröffentlichte er in seiner schon oben angeführten, erst kürzlich erschienenen Arbeit.

Schlußfolgerung.

Der Nutzen dieser Arbeit möchte darin bestehen, daß diejenigen Kollegen, die Kranke mit Trigemimusneuralgie behandeln müssen, erneut auf den wichtigen Zusammenhang zwischen Neuralgie und Pyramidenspitzenentzündung hingewiesen werden, damit sie Irrtümer vermeiden und ihre Patienten so früh wie möglich fachärztlich Untersuchung und Behandlung zuführen.


Zum Schlusse meiner Arbeit möchte ich

Herrn Priv. Doz. Dr. H. Richter

für die gütige Ueberlassung des Themas und die gewährte Unterstützung meinen verbindlichsten Dank aussprechen.

Lebenslauf.

Ich wurde am 9. Oktober 1910 in Bamberg geboren. Nach Besuch der Oberrealschule in Bamberg legte ich im Frühjahr 1930 meine Reifeprüfung ab. Darauf ließ ich mich im Wintersemester 1930/31 als Studierender der Zahnheilkunde an der Universität Erlangen immatrikulieren. Im Frühjahr 1934 bestand ich das Physikum und im Oktober 1935 legte ich mein zahnärztliches Staatsexamen ab.



Literaturverzeichnis.

- alan M. und Belinof: Monatsschr. f. Ohrenh. Bd. 64, S. 1185. 1930.
- igler M.: Zeitschr. f. H. N. O. Bd. 25, S. 249. 1930.
- rock W.: Zeitschr. f. H. N. O. Bd. 6, S. 380. 1923.
- runner H.: Zeitschr. f. H. N. O. Bd. 25, S. 383. 1930.
- urger: Acta Oto-Laryngo. Bd. 13, S. 353, 1929.
- ngelhardt G.: Zeitschr. f. H. N. O. Bd. 11, S. 194. 1925.
- ppstein H.: Archiv f. Ohrenhk. Bd. 135, S. 351. 1933.
- lick H. N.: Zentralblatt f. H. N. O. Bd. 21, S. 55. 1934.
- rabscheid E.: Monatsschr. f. Ohk. Bd. 65, S. 289. 1931.
- radenigo G.: Archiv f. Ohk. Bd. 62, S. 255. 1904 und Bd. 74, S. 149. 1907.
- rünberg K.: Zeitschr. f. Ohk. Bd. 75, S. 66. 1917.
- abermann J.: Archiv f. Ohk. Bd. 42, S. 128. 1897.
- esse W.: Archiv f. Ohk. Bd. 113, S. 156. 1925.
- ilgermann R.: Zeitschr. f. O. H. K. Bd. 40, S. 311. 1902.
- örner O.: in Handburch der H. N. O. H. K. von Denker-Kahler Bd. 6, S. 190.
- raus L.: Archiv f. O. H. K. Bd. 128, H. 4, 1931 und Bd. 130, S. 349, H. 4, 1932.
- ange W.: Passow-Schäfer Beitr. Bd. 2, S. 162. 1909.
- oebel H.: Archiv f. Ohk. Bd. 115, S. 191. 1926.
- ayer O.: Monatsschr. f. Ohk. Bd. 63, S. 970. 1929.
- ppikofer E.: Zeitschr. f. H. N. O. Bd. 21, S. 454. 1928.
- ragier E.: Monatsschr. f. Ohk. Bd. 67, S. 1491. 1933.
- ichter H.: Archiv f. O. N. K. Bd. 140, S. 360. 1936.
- chlander E.: Monatsschr. f. Ohk. Bd. 57, S. 975, 1923 und Zeitschr. f. H. N. O. Bd. 12, S. 492. 1925.
- chmiegelow E.: Archiv f. Ohk. Bd. 26, S. 84. 1888.

- T o b e c k : Zeitschr. f. H. N. O. Bd. 36, S. 384. 1934.
v. Trö l t s c h A.: Lehrbuch der Ohk. 1881, Leipzig F. C. W. Vog
U f f e n o r d e W.: Archiv f. O. N. K. Bd. 105, S. 87, 1920 und B
122, S. 288, 1929. Zeitschr. f. Laryngo-Rhinol. Bd. 15, S. 81. 19
U l r i c h K.: Zeitschr. f. H. N. O. Bd. 9, S. 403. 1924.
U r b a n t s c h i s c h V. Lehrbuch d. Ohk. Urban; Berlin, Wien. 1901
V o g e l : Internat. Zentralbl. f. Ohk. Bd. 18 u. 19.
V o ß O.: Acta Oto-Laryngol Bd. 15, S. 469. 1931.
-

Buchdruckerei Koch, Eltmann.